




Ta Creon varje gång du äter, efter den första tuggan, tillsammans med dryck.



Fetare och större måltider kräver mer matsmältningsenzym.



Tala med din läkare om du misstänker att du behöver högre doser eller om du har andra frågor och funderingar.



Titta gärna på filmen om Creon som finns på webbplatsen medicininstruktioner.se

Ta alltid del av den bipacksedel som finns i förpackningen. **Creon®** (pankreatin) F, OTC. ATC kod A9A1. SPC 2017-02-15. **Verksamma beståndsdelar:** pankreasenzymer (amylas, lipas, proteas). **Beredningsform:** enterokapslar. **Indikation:** exokrin pankreasinsufficiens med malabsorption. **Styrkor:** 10 000, 25 000 och 40 000 (motsvarande Ph.Eur.enheter lipas) **Dosering:** Bör anpassas individuellt baserat på graden av maldigestion och mängden fett i måltiden. Den dos som krävs för en måltid varierar från cirka 25 000 till 80 000 Ph. Eur.enheter lipas och hälften av den individuella dosen för mellanmål. För övrig information se www.fass.se.

The logo for Creon Pankreatin features the word "Creon" in a bold, blue, sans-serif font. Above the letter "n" is a stylized graphic of three blue curved lines, resembling a signal or a molecular structure. Below "Creon" is the word "Pankreatin" in a smaller, blue, sans-serif font.

Creon®
Pankreatin